

DIRETTORE SANITARIO
DR.SSA LOREDANA BOTTALICO

ODONTOIATRA SPECIALISTA IN ORTOGNATODONZIA PERFEZIONATA IN ODONTOIATRIA INFANTILE DISFUNZIONI DELL'ATM E CORRELAZIONI POSTURALI

DENTOSOPHY S.R.L.
ITALY / 70125 BARI, VIA OMODEO 57
T. +39 348 9760941 // +39 080 8093657
DENTOSOPHY.IT // INFO@DENTOSOPHY.IT

P.IVA 08152230721

GRAVIDANZA

Già dal 2° mese di gravidanza i denti del bambino sono in via di formazione. La loro cura deve iniziare già durante la maternità. Per questo motivo la mamma per il suo bimbo e per se stessa, deve:

- **1. Non fumare**: almeno durante i 9 mesi di gravidanza perché il fumo riduce la quantità di ossigeno che arriva al feto danneggiando, non solo la formazione dei denti, ma tutto l'organismo del bimbo.
- 2. <u>Corretta alimentazione</u>: con l'ampio apporto di vitamine C (agrumi, kiwi, pomodori), D (latticini, uova, fegato) e calcio (latte, formaggi, yogurt).
- **3.** <u>Fluoro</u>: assicurarsi che nella zona dove si risiede le acque dell'acquedotto siano fluorate. Se si usa solo acqua minerale, controllarne il contenuto di fluoro sull'etichetta.
- **4.** <u>Igiene della bocca</u>: durante la gravidanza la bocca della mamma è più soggetta a carie e infezioni.

Quindi occorre:

- fare una seduta di pulizia dal dentista al 2° o 3° mese ed un'altra all'8°
- usare regolarmente un collutorio al fluoro che svolge un'importante azione di prevenzione della carie
- seguire un corretto programma di igiene presso il proprio domicilio; altrimenti durante la gravidanza le gengive e i denti della mamma si ammaleranno e sarà facile contaminare la bocca del piccolo appena nato con batteri che causeranno fastidiose infiammazioni delle gengive e successivamente intaccheranno i suoi dentini.

L'igiene orale ha effetto diretto sulla gravidanza.

Significative prove scientifiche suggeriscono un legame tra le malattie gengivali ed il rischio di nascite premature e sottopeso. Le donne incinte con presenza di malattia gengivale e cattiva igiene durante la gravidanza, sono **più predisposte** al rischio di **parto prematuro** e di nascita del **bambino sotto peso**.